

Esquema Nacional de Vacunación El Salvador - 2009

Recién Nacido	2 Meses 4 Meses 6 Meses	12 Meses	15 a 18 Meses	4 Años	Adolescentes, adultos y adultos mayores	Mujeres Embarazadas	Grupo en Riesgo
<p>BCG Previene formas invasoras de tuberculosis</p>	<p>3 Dosis (2,4 y 6 meses)</p> <p>Pentavalente Incluye: DPT + HB + HiB DPT: difteria, tosferina y tétanos HB: Hepatitis B HiB: Haemophilus influenzae tipo B</p> <p>3 Dosis (2,4 y 6 meses)</p> <p>Polio Oral Poliomielitis</p> <p>2 Dosis (2 y 4 meses)</p> <p>ROT Rotavirus</p>	<p>1a. Dosis de:</p> <p>Triple viral SPR Sarampión, paperas y rubéola</p>	<p>1er. Refuerzo de:</p> <p>DPT difteria, tosferina y tétanos</p> <p>Polio Oral Poliomielitis</p>	<p>2do. Refuerzo de:</p> <p>DPT Difteria, tosferina y tétanos</p> <p>Polio Oral Poliomielitis</p> <p>2da. Dosis de:</p> <p>Triple Viral SPR Sarampión, paperas, y rubéola</p>	<p>Td Tétano y difteria Toda persona debe recibir 5 dosis más 1 refuerzo cada 10 años. Considera las dosis de DPT recibidas en la niñez</p>	<p>Td Toxóide Tetánico Toda mujer embarazada debe haber recibido al menos 2 dosis de Td</p>	<p>Td Tétano y difteria HB Hepatitis B SR Sarampión y rubéola</p> <p>Niños de 6 a 23 Semanas, Adultos de 60 años y más y Personal de Salud</p> <p>Influenza</p>